





AZOCOR® 105



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΑΚΙ 25kg παλέτα 1.500kg

AZOCOR® 105 / Χαρακτηριστικά:


- **Μορφή:** Ομοιογενή κυλινδρικά πέλλετ με μέση διάμετρο 3-4mm και μέσο μήκος 5-7mm.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ

Στο **Azocor® 105**, η απελευθέρωση αζώτου είναι βαθμιαία και σταδιακή: (καμπύλη ανοργανοποίησης)

- 1 Η αρχική απελευθέρωση αζώτου είναι **φυτικής προέλευσης**, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις αρχικές ανάγκες του φυτικού κύκλου της καλλιέργειας. Σε αυτή τη πηγή αζώτου, έχει προστεθεί κλάσμα ελεύθερων αμινοξέων, για να επιταχύνει το ξεκίνημα της απελευθέρωσής του Αζώτου.
 - 2 Στο επόμενο στάδιο, η θρέψη επιτυγχάνεται με την απελευθέρωση αζώτου από την **αποσύνθεση πούπουλων** σε συνδιασμό με την παρουσία πρωτεϊνών, τα οποία απαιτούν μία πιο παρατεταμένη και μακρόχρονη μικροβιακή ενεργοποίηση, (μεγαλύτερος χρόνος αποδέσμευσης).
 - 3 Στο τελευταίο στάδιο, ενεργοποιείται και το τελευταίο συστατικό του **Azocor® 105**, δηλαδή, οι **κεράτινοι ιστοί** (κέρατα, νύχια, κα) τα οποία εξαιτίας της πιο σύνθετης δομής τους, απαιτούν και τον περισσότερο χρόνο αποδέσμευσης. Η συγκεκριμένη πηγή κερατίνων ιστών, προμηθεύουν τα φυτά με πρωτεΐνες.
- Οι απώλειες αζώτου ελαχιστοποιούνται λόγω της έκπλυσης από την επιφάνεια του εδάφους, εξασφαλίζοντας συνεπώς μια πιο ορθολογική εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση σύστασης του εδάφους, καθώς και θετικό αντίκτυπο στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες.
 - Το **Azocor® 105** εγγυάται τη βελτίωση του μικροβιακού φορτίου του εδάφους καθώς οι πηγές αζώτου από τις οποίες προέρχεται είναι ζωνικής και φυτικής προέλευσης, παρέχοντας συνεπώς τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τη δραστηριοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος μικροοργανισμών στο έδαφος.

AZOCOR® 105 / Θρέψη:





- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί την περίοδο του φθινοπώρου (Οκτώβριος-Νοέμβριος) και αργά το χειμώνα (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Δεν ξεπλένεται και δρα σταδιακά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου.
- Το **AZOCOR® 105** ενδείκνυται για τη λίπανση όλων των εκτεταμένων καλλιεργειών (ιδιαίτερα ΒΙΟ) όπως τα σιτηρά του φθινοπώρου-χειμώνα, το καλαμπόκι, ο ηλιανθος, η σόγια κλπ.
- Το **AZOCOR® 105** μπορεί να αναμειχθεί κατά την προετοιμασία του εδάφους σε ποσότητα των 4-5 kg ανά κυβικό μέτρο εδάφους πριν τη σπορά ή να διανεμηθεί κατά τη μεταφύτευση (συνιστάται να ακολουθήσει πότισμα).
- Το **AZOCOR® 105** έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδανικό για τις καλλιέργειες "BabyLeaf" (Λαχανικά κοπής ΙVα) καθώς δημιουργεί μια βασική γονιμότητα στο έδαφος που παρέχει τη σωστή ισορροπία για καλλιέργειες μικρού/σύντομου κύκλου. Δεν προκαλεί την υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, δεν δημιουργεί σήψεις. Η διανομή του προϊόντος στο χωράφι πρέπει να πραγματοποιείται σε ελάχιστο βάθος 2 cm και μέγιστο 15 cm. Η εφαρμογή σε δένδροκαλλιέργειες πρέπει να είναι σε απόσταση από τον κορμό των 18/20 cm και βάθος 10/15 cm.





ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ AZOCOR 105®

ρΗ (ενδεικτικό)	6-7	Υγρασία (H ₂ O)	12-15%
Άζωτο (N) οργανικό ολικό	10,5-11%	Άνθρακας(C) οργανικός ΒΙΟ προέλευσης	32%
Ανυδρίτης φωσφορικός (P ₂ O ₅) ολικός από οργανικά συστατικά	1,2-1,5%	Οργανική ύλη	64%
Οξείδιο του Καλίου (Κ ₂ O) ολικό από οργανικά συστατικά	1-1,5%	Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)	0,3%
Ειδικό βάρος	0,7 kg/lit - 0,8 kg/l	Σίδηρος (Fe)	22,5 mg/kg
		Βόριο (B)	471 mg/kg

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΠΟΧΗ	ΔΟΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ 	Πριν τη σπορά	70-80 kg/στρμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος μετά την τελευταία εργασία στο χωράφι
	εναλλακτικά Επιφανειακά στο αδελφωμα	40-50 kg/στρμ.	Εάν είναι δυνατό, στη συνέχεια, δημιουργήστε αυλάκια. (αυλακωτή)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ 	Πριν τη σπορά	80-90 kg/στρμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος μετά την τελευταία εργασία στο χωράφι
	εναλλακτικά επιφανειακά στο 6° φύλλο	50-60 kg/στρμ.	τάπισμα/σκάλισμα
ΚΗΠΟΙ-ΓΚΑΖΟΝ 	Πριν τη σπορά ή επιφανειακά	80-120 g/m ²	Διανείμετε το προϊόν, έπειτα ενσωματώστε και στο τέλος καλό θα ήταν να ακολουθηθεί πότισμα.
BABY LEAF (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΠΗΣ IV^ο ΓΚΑΜΑΣ) 	Πριν τη σπορά κάθε 2 καλλιεργητικούς κύκλους (κάθε 1 κύκλο για τη ρόκα)	40-80 kg ανά 1.000 m ²	Ενσωματώστε στα 5-10 cm και στη συνέχεια ποτίστε

ΆΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 	Μετασυλλεκτικά ή την άνοιξη	50-70kg/στρμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος, εάν υπάρχουν χόρτα στο έδαφος, εφαρμόστε πριν την κοπή.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 	Πριν τη σπορά ή πριν τη μεταφύτευση	70-80 kg/στρμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος μετά την τελευταία εργασία στο χωράφι

Οι καλλιέργειες που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικές για κάθε κατηγορία.

Το AZOCOR 105® χρησιμοποιείται σε πολλές ακόμη καλλιέργειες με τις ίδιες μεθόδους χρήσης.

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν, πάντα σε συνάρτηση με τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής/ζώνης (πχ γονιμότητα εδαφών, ύψος βροχής, θερμοκρασία κ.α.) καθώς και με το πρόγραμμα λίπανσης που εφαρμόζεται για την κάθε καλλιέργεια.

Το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τις ρίζες των φυτών. Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και ζώα.

Κρατήστε το σε στεγνό και προστατευμένο μέρος



Τα στοιχεία που αναγράφονται στις συσκευασίες ακολουθούν τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα δεδομένα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Η FOMETspa διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πετάξτε με τον πιο κατάλληλο τρόπο



ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 • 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 753 161-2 • 2310 752 998 FAX: 2310 753 742

E mail: agrong@otenet.gr • website: www.agrongsa.com

