




AZOSUPER® N28

ΣΕΙΡΑ AZOMAT



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΣΑΚΙ 25kg, παλέτα 1.500kg

2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
ΑΖΩΤΟΥ

ΑΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

AZOSUPER® N28 / Χαρακτηριστικά

Φυσική μορφή: ομοιογενή κυλινδρικά πέλλετ με μέση διάμετρο 3-4 mm και μήκος 4-5 mm.



- Η συγκεκριμένη οργανική σύνθεσή του, το καθιστά πολύ πιο αποτελεσματικό σε σχέση με άλλα οργανοχημικά αζωτούχα λιπάσματα που περιέχουν άζωτο μίας μορφής: π.χ. δέρμα, κεράτινους ιστούς κ.α.

- Η ταυτόχρονη παρουσία οργανικής ουσίας από βοοειδή καθώς και από πούπουλα εγγυάται: την άμεση κάλυψη των βασικών θρεπτικών απαιτήσεων των φυτών λόγω της ουρίας, ενώ το άζωτο που προέρχεται από τα πτεράλευρα διαρκεί περισσότερο καιρό (3-4 μήνες), ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την ικανότητα διέγερσης και ενεργοποίησης του εδάφους των διαφορετικών πηγών αζώτου

- Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μεταβάλλονται από καμία διαδικασία θερμής επεξεργασίας (φούρνου ή ζεστού αέρα).

- Το προϊόν είναι ξηρό και είναι εύκολο να διανεμηθεί.

- Είναι προϊόν όπου λόγω των υσυστατικών του, είναι ιδανικό για καλλιέργειες μεσαίου/μεγάλου κύκλου, με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο.



Σταδιακή απελευθέρωση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στο AZOSUPER® N28 (καμπύλη ανοργανοποίησης)

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Άζωτο (N) Ολικό	28%
Άζωτο (N) Οργανικό	5%
Άζωτο (N) Ουρικό	23%
Άνθρακας (C) Οργανικός	14-16%
Οργανική Ουσία	28-32%
Υγρασία (H_2O)	10-12%

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (υπολογισμένοι σε UFC/GR)	
Βακτηριακό Φορτίο (αερόβιο) Ολικό	541.000.000
Βακτηριακό Φορτίο (αναερόβιο) Ολικό	428.000.000
ρΗ (ενδεικτικό)	7-7,5
Ειδικό Βάρος	1,1-1,2 kg/l

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΕΠΟΧΗ	ΔΟΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΣΤΗΡΑ	Πριν την σπορά	700-800 kg/10 στρεμ	Ενσωμάτωση προϊόντος με την τελευταία εργασία στο χωράφι
	εναλλακτικά επιφανειακά στο αδέλφωμα	400-500 kg/10 στρεμ	Εάν είναι δυνατό κατά την αναμόχλευση του εδάφους
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ/ΗΛΙΑΝΘΟΣ	Πριν τη σπορά	800-900 kg/10 στρεμ	Ενσωμάτωση προϊόντος και πότισμα.
	εναλλακτικά επιφανειακά στο 6 ^ο φύλλο	500-600 kg/10 στρεμ	Τσάπισμα/σκάλισμα
ΚΗΠΟΙ/ΓΚΑΖΟΝ	Πριν τη σπορά ή επιφανειακά	70-120 gr/m ²	Ενσωμάτωση προϊόντος και πότισμα, με την τελευταία εργασία στο χωράφι

ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	Κάλυψη με την βλαστική εμφάνιση	400-600 kg/10 στρεμ	Άρδευση, διαφορετικά κατά την αναμόχλευση του εδάφους.
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ	Πριν τη σπορά ή πριν τη μεταφύτευση	400-500 kg/10 στρεμ σε γραμμές των 50cm εναλλακτικά 600-800 kg/10 στρεμ.	Ενσωμάτωση προϊόντος με την τελευταία εργασία στο χωράφι

Οι καλλιέργειες που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικές για κάθε κατηγορία. Το AZOSUPER®N28 χρησιμοποιείται για πολλές ακόμη καλλιέργειες, με τις ίδιες μεθόδους χρήσης

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν, πάντα σε συνάρτηση με τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής/ζώνης (πχ. Γονιμότητα εδαφών, ύψος βροχής, θερμοκρασία κ.α.) καθώς και με το πρόγραμμα λιπανσης που εφαρμόζεται για την κάθε μία.

Το προϊόν δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τις ρίζες των φυτών. Πριόν μόνο για επαγγελματική χρήση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και ζώα.

Κρατήστε το σε στεγνό και προστατευόμενο μέρος



Τα στοιχεία που αναγράφονται στις συσκευασίες ακολουθούν τις προδιαγραφές της Ισχύουσας νομοθεσίας. Όλα τα δεδομένα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Η FOMEI έχει διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Πετάξτε με τον πίο κατάλληλο τρόπο.