

# Energizer® Combi

## ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ



- Αζωτούχο λίπασμα σε **υγρή μορφή**
- **Διαφυλλικές** εφαρμογές και **υδρολίπανση**
- Βιοδιεγερτικό, με **υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα αμινοξέα** συμπλοκοποιημένα σε κλάσμα χουμικού οξέος

### Επιδράσεις των χουμικών οξέων

- Αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους
- Ρυθμίζουν και σταθεροποιούν το pH του εδάφους
- Διασπών τα άλατα από προηγούμενες λιπάνσεις
- Προκαλούν άριστη δομή, αερισμό και υψηλή υδατοϊκανότητα στο έδαφος
- Προσροφούν τοξικές οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα
- Θρέφουν τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς
- Διεγείρουν την ανάπτυξη ριζιδίων για πετυχημένη μεταφύτευση
- Αυξάνουν την πρόσληψη των ανόργανων στοιχείων N, P, K, Mg, Ca, και των Ιχνοστοιχείων
- Βελτιώνουν την ποιότητα του καρπού
- Αυξάνουν την παραγωγή
- Ενισχύουν το μεταβολισμό του φυτού, ως φυσικές ορμόνες
- Προκαλούν πρωιμότητα



### ΣΥΝΘΕΣΗ

Αζωτο (N) ολικό .....	3,6% (42,5 g/L)
Αζωτο (N) οργανικό .....	3,6% (42,5 g/L)
Άνθρακας (C) οργανικός .....	11,4% (134,5 g/L)
Ελεύθερα αμινοξέα ολικά .....	25% (265 g/L)
Χουμικό οξύ καθαρό.....	6%(70,8 g/L)

### ΜΟΡΦΗ

Εναιώρημα σε νερό

### ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

1180 g/L

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μπουκάλι 1 L x 10 τεμ

Μπουκάλι 5 L x 4 τεμ

Δοχείο 20 L

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΕΠΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
<b>ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ</b> Δενδροκομία, Ελιά, Αμπέλι, Εσπεριδοειδή, Ακτινίδια	250-300 ml/100L	2 έως 3 εφαρμογές στα πιο ευαίσθητα στάδια και σε απόσταση 15-20 ημερών
Φυλλώδη κηπευτικά (σαλάτες, σπανάκι κ.α.)	200 ml/100L	2 εφαρμογές στην αρχή του σταδίου βλάστησης και σε απόσταση 15 ημερών
Κηπευτικά (ντομάτα, καρπούζι, κολοκυθάκι κ.α.)	200-250 ml/100L	Ξεκινώντας πριν την ανθοφορία, 3 εφαρμογές σε απόσταση 15 ημερών
Ανθοκομικά φυτά	150-200 ml/100L	Στην αρχή του σταδίου αναπτυξης, 3 εφαρμογές σε απόσταση 20 ημερών.
Πατάτα, καπνός, Αγκινάρες	250-300 ml/100L	2 έως 3 εφαρμογές σε απόσταση 20 ημερών
Καλαμπόκι, ζαχαρότευτλο, σόγια, δημητριακά	1,5-2 L /10 στρεμ.	Σε συνδυασμό με μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα
<b>ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ</b>	3-4 L /10 στρεμ.	Στην αρχή του καλλιεργητικού κύκλου, εφαρμόζοντας κάθε 15 ημέρες

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Μην αναμιγνύετε με χαλκούχα προϊόντα (εκτός από την καλλιέργεια της ελιάς) για να αποφεύγετε την φυτοτοξικότητα του χαλκού. Σε μερικές ποικιλίες δαμάσκηνο, οι οποίες είναι ευαίσθητες στη δράση των αμινοξέων, μπορεί να εμφανιστεί σύντομη φυτοτοξικότητα.