

ΠΡΟΪΟΝ
100%
ΦΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΪΟΝ
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
BIO



ΣΥΝΘΕΣΗ

100%
Οργανική
Ουσία
απο φυτικά πάνελ
του Ricinus sp.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 25 kg
- ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ 1500 kg

Το **RICINITO®** είναι ένα οργανικό λίπασμα εξολοκλήρου φυτικής προέλευσης.

Το **RICINITO®**, προέρχεται απο φυτικά πάνελ απο το πάνελλο απο το φυτό Ricinus, πλούσιο σε υδροδιαλυτές πρωτεΐνες, μετά την εκχύλιση του ελαίου από τον σπόρο.

Το **RICINITO®** είναι ένα "Υψηλής ποιότητας" οργανό λίπασμα αζώτου, που εγγυάται τη θρέψη με σταδιακή απελευθέρωση του Αζώτου με την πάροδο του χρόνου. Η διάρκεια της θρεπτικής δράσης του είναι περίπου 80/90 ημέρες, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται και την τεχνική καλλιέργειας.

Μία από τις κύριες ιδιαιτερότητές του δίνεται από τη φυτική ουσία που υπάρχει τόσο με τη μορφή "λεπιών" 1-2mm όσο και με τη μορφή σκόνης. Η συγκεκριμένη μορφολογία επιτρέπει την άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες του εδάφους και τα λεπτότερα συστατικά του, συμβάλλοντας έτσι στον εμπλουτισμό με θρεπτικά στοιχεία στις περιοχές των ριζικών συστημάτων των καλλιεργειών. Αντιμετωπίζει δραστικά την "κόπωση του εδάφους" και βοηθά στην ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών για την καλύτερη βιολογική και θρεπτική ισορροπία του εδάφους.

Όλα τα χαρακτηριστικά ενισχύουν και καθιστούν την καλλιέργεια πιο ανθεκτική στις αντιξοότητες κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το **RICINITO®** είναι υπο τη μορφή λεπιού / σκόνης, σε μέγεθος 1-3 mm:

- 1) **100% καθαρό**, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.
- 2) **Βαρέων μετάλλων** από υπολείμματα βιομηχανικής επεξεργασίας.
- 3) **100% απουσία GTM** (Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς).

Ειδικό βάρος: 0,63 kg / l

Συνδυαστικότητα: αναμειγνύεται με όλα τα προϊόντα σε σκόνη τόσο οργανικά όσο και ανόργανα.

Οσμή: άοσμο, χωρίς εναλλαγές με την πάροδο του χρόνου κατά την αποθήκευση (εφόσον γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα αποθήκευσης).

Σταθερότητα δράσης στο χρόνο: Απόλυτη. Δεν δημιουργεί διαδικασίες ζύμωσης κατά την αποθήκευση (εφόσον γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο).

Αποδέσμευση: σταδιακή και πλήρης σε φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας και δραστηριότητας εδάφους.

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ



Προϊόν σε λέπι
με Ø = 1-2 mm +
σκόνη.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



Αζωτο (N) Ολικό Οργανικό	5 - 6 %	Φωσφορικός Ανυδρίτης (P ₂ O ₅) Ολικός	2 - 2,5 %
Ανθρακας (C) Οργανικός	38 - 40 %	Οξειδίο του Καλίου (K ₂ O) Ολικό	1 - 1,5 %
Οργανική Ουσία	76 - 80 %	Οξειδίο του Μαγνησίου (MgO) Ολικό	0,5 - 0,7 %
Υγρασία (H ₂ O)	2 - 4 %	pH	6 - 7

Περίοδος Εφαρμογής

Κηπευτικές Καλλιέργειες: Διασπείρετε και ενσωματώστε σε βάθος 10-15 εκ. προ σποράς - προ μεταφύτευσης. Ενδείκνυται η διασπορά να είναι διαμερισμένη σε περισσότερες φορές (καθώς και η κάλυψη). Πότισμα.

Δενδροκομικές Καλλιέργειες: Ενσωματώστε καθολικά ή γραμμικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν χόρτα, τα κόβουμε και μετά ενσωματώνουμε το προϊόν για να διευκολύνουμε τη δράση του. Χάρη στην οργανική του σύνθεση, το προϊόν δεν εκπλύνεται. Πότισμα.

Εκτατικές Καλλιέργειες: Διασπείρετε και ενσωματώστε σε βάθος 10-15 εκ. κατά την προετοιμασία του εδάφους ή της σποράς.

Γκαζόν: Διανείμετε ομοιόμορφα στην επιφάνεια του γκαζόν και κατά μήκος του. Αν είναι δυνατόν χρησιμοποιήστε ειδικό κύλινδρο για γκαζόν, για την ενσωμάτωση του προϊόντος. Πότισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: με βάση τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται, αυτό είναι ένα προϊόν για το οποίο ενδείκνυται η χρήση γαντιών, μάσκας και προστατευτικών γυαλιών (όπως τα προϊόντα θείου ή χαλκού). **Τα ζώα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τις περιοχές που έχουν υποστεί αγωγή τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την παρέμβαση. Συνιστάται η άρδευση. Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ. ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ**

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ



Δοσολογία και μέθοδοι χρήσης σε Kg / στρέμμα

ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: (νέα φύτευση)

60-70 σε πλήρες πεδίο, ή 50-60 g ανά φυτό ενσωματωμένο με το έδαφος.

ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: (σε παραγωγή, στη σειρά πλάτους 60-70 cm)

Φουντούκι	50-70
Κεράσι, Αμύγδαλο	60-80
Ακτινίδιο, Κάστανος, Ρόδι	70-90
Μήλο, Αχλάδι	70-90
Ελιά, Μανταρίνι, Κλημεντίνα, Καρύδι, Δαμάσκηνο	80-100
Ροδάκινο, Λεμόνι, Βερίκοκο, Πορτοκάλι	70-90
Επιτραπέζια Σταφύλια	50-60
Οινοποιήσιμα Σταφύλια	50-60

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: (σε παραγωγή, στη σειρά πλάτους 60-70 cm)

Φασόλι, Φασολάκι	40-50
Σπαράγγια, Λαχανικά κοπής, Σπανάκι	80-90
Σκόρδο, Κρεμμύδι, Καρότο, Λάχανο, Μάραθο	60-70
Μπιζέλι, Κολοκύθα	

Καρπούζι, Αγκινάρα, Ραπανάκι	700 - 800
Πεπόνι, Ντομάτα, Κολοκύθι, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πατάτα, Φράουλα, Πιπεριά	700 - 1000

Η χρήση σε λαχανικά θερμοκηπίου, καθώς και IV γκάμας, απαιτεί τουλάχιστον 150 - 200 kg ανά 1000 m²

ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:

Μαλακό Σιτάρι - Σκληρό Σιτάρι	60-80
Ρύζι, Σόργο, Αραβόσιτος	50-90
Κτηνοτροφικό Καλαμπόκι	70-90
Ζαχαρότευτλα	60-80
Καπνός	60-90

Φράχτες και Μπορντούρες	400 - 500 γρ. / γραμμικό μέτρο
Παρτέρια	80 - 120 γρ. / τ.μ.
Χλοοτάπητες	50 - 80 γρ. / τ.μ.

N.B. Οι καλλιέργειες που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές για κάθε κατηγορία. Το **RICINITO®** εφαρμόζεται σε πολλά άλλα είδη με τις ίδιες μεθόδους χρήσης.

ΧΡΗΣΗ ερασιτεχνική/ κηπουρική / φυτώριο:

δυνατότητα χρήσης του **RICINITO®** με διανομή στην επιφάνεια του δοχείου και ακολουθεί άφθονη άρδευση.

Η δοσολογία για λουλούδια σε δοχείο με διάμετρο 14εκ. είναι περίπου 20-40 γρ.

Σε περίπτωση πράσινων φυτών σε δοχείο 22 εκ., η ποσότητα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 20-30%.

Το **RICINITO®** μπορεί να αναμιχθεί κατά την προετοιμασία με το χώμα γλάστρας σε αναλογία περίπου 8 - 10 kg ανά κυβικό μέτρο εδάφους.

Οι δοσολογίες εξαρτώνται επίσης από το σχέδιο λίπανσης. Επιπλέον, προτείνεται να μην εφαρμοστούν λιγότερο από 50 - 60 κιλά ανά στρέμμα.

Οι προαναφερθείσες δόσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (γονιμότητα: χημική, φυσική και βιολογική, βροχοπτώσεις και θερμοκρασία).



ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 • 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 2310 753 161-2 • 2310 752 998 FAX: 2310 753 742

E mail: agrong@otenet.gr • website: www.agrongsa.com